

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 23-3-72 291925

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 138 de MARS 1972

16 Mars 1972/n° 4

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du poirier : La présence de pustules chancreuses de Tavelure sur rameaux rend nécessaire la protection des variétés de poiriers sensibles à cette maladie; il est donc conseillé d'effectuer un traitement cuprique dès le stade C3 (apparition des pointes vertes des premières feuilles).

Anthonome du pommier : Ce charançon hiverne à l'état adulte. Dès le relèvement de la température (maximum diurne 11°, moyenne journalière 7 à 8°) l'anthonome pond, après une courte période alimentaire, dans les bourgeons à fleur, du stade B à C2.

Intervenir à l'aide de lindane 12 g MA/HL. (Très nombreuses spécialités à formulations : poudres mouillables, liquides, solutions huileuses).

GRANDE CULTURE

Gros charançon de la tige du colza d'hiver :

Les toutes premières piqûres nutritives ont été observées hier en secteurs chauds.

Ce parasite est en régression dans notre région Nord-Est depuis plusieurs années et l'invasion devrait rester faible. Toutefois, dans certains secteurs, la rarefaction des cultures de colza d'hiver peut augmenter les risques.

La croissance des colzas est actuellement très rapide et une intervention n'est plus à envisager dès que les tiges atteignent 15 cm.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE

A. GODIN

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATTRE.